


ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ



ИППП – группа инфекционных заболеваний, передающихся преимущественно половым путем (а также при **любом** сексуальном контакте (вагинальном, оральном, анальном))



- Сифилис Гонорея Хламидиоз Микоплазмоз
- Трихомониаз Педикулез Генитальный герпес
- Аногенитальные бородавки СПИД Гепатит В
- Чесотка Уреаплазмоз






- Необычные выделения из половых органов или прямой кишки
- Зуд, жжение, раздражение, отек в области половых органов
- Боли внизу живота или в области поясницы
- Болезненные ощущения во время полового акта
- Рези при мочеиспускании
- Сыпь на теле, ладонях, подошвах
- Язвочки, пузырьки, эрозии на половых органах, в полости рта, в области заднего прохода
- Увеличение лимфатических узлов



ВНИМАНИЕ!!!

- ИППП часто протекают *стерто*, *малосимптомно* и даже бессимптомно. Поэтому их можно долго не обнаруживать или расценивать как простуду либо урологическое или гинекологическое заболевание
- Если партнер чистоплотен и аккуратно одет – это еще не значит, что он здоров

Она придет внезапно в гости,
Страшнее сказочных старух,
Проникнет в кровь, оближет кости,
Откусит нос,
Отнимет слух.




- Иван Грозный
- Ги де Мопассан
- Врубель
- Ницше
- Короленко
- Шуман
- Гете
- Муссолини
- Тулуз Лотрек
- Гитлер
- ???

СИФИЛИС — тяжелое заболевание с хроническим течением. При *несвоевременном* лечении разрушает головной и спинной мозг, необратимо поражает жизненно-важные органы



- Заражение от больного человека при половом контакте, реже — через предметы, загрязненные выделениями больного, содержащие возбудитель через поврежденную кожу или слизистые
- Внеполовое «бытовое» заражение при тесном контакте здорового с больным — при пользовании общими предметами - зубной щеткой, сигаретой, губной помадой
- Внутриутробно — от больной матери заражение плода
- Через кровь — при переливании, пользовании одним шприцем и т. д .

Возбудитель сифилиса – бледная спирохета



Источник заражения –
больной человек

Сифилис характеризуется стадийностью течения



- Инкубационный период – около месяца с момента заражения
- Врожденный сифилис
- Ранний сифилис с проявлениями и скрытый
- Поздний сифилис с проявлениями и скрытый

Проявления сифилиса





- Астения
- Депрессия
- Слабоумия
- Галлюцинации
- Бред с манией величия
- Расстройство речи
- Параличи
- Смерть

- Прогрессивный паралич
- Спинная сухотка




Врожденный сифилис



Гонорея – при несвоевременном лечении ведет к бесплодию и импотенции.

Инкубационный период от 2-х дней до месяца
(возможно поражение глаз и суставов)




- Источник заражения – больной человек
- Пути заражения – половой и внеполовой (общая постель, ванна, предметы гигиены – актуален для женщин и девочек)

Инкубационный период при ГОНОРЕЕ от 2-х дней до месяца



- Заражение возможно во время родов, при прохождении ребенка через родовые пути матери – возникает поражение глаз, а у девочек еще и поражение гениталий
- Гонококк может быть занесен в прямую кишку и на миндалины
- При заражении во время беременности возможен выкидыш, преждевременные роды, послеродовые осложнения

Трихомониаз — паразитарное воспалительное заболевание, по клиническим признакам похоже на гонорею, но требует принципиально другого лечения



Источник заражения — больной человек, однако распространено бессимптомное носительство трихомонад

Пути заражения — половой, у маленьких девочек — возможен внеполовой через предметы гигиены

Инкубационный период — от 3-х дней до 3-х недель

- Часто сочетается с гонореей
- Приводит к развитию спаечного процесса в малом тазу у женщин, у мужчин приводит к простатиту и импотенции, а также к бесплодию

Хламидиоз — инфекция, вызывающая воспаление мочеполового тракта, глаз, суставов, дыхательных путей, толстого кишечника и ряд системных проявлений





- Источник заражения — больной человек
- Пути заражения — при половом контакте с больным, либо **ИНФИЦИРОВАННЫМ** человеком
- Возможно заражение через предметы обихода
- Доказано внутриутробное инфицирование плода

Микоплазмоз и Уреаплазмоз – инфекционные заболевания, вызывающие воспаление органов мочеполовой системы



- Микоплазмы и уреаплазмы занимают промежуточное место между бактериями, вирусами и простейшими и имеют очень маленькие размеры.
- Могут быть обнаружены и у больных и у здоровых людей
- Это условно – патогенные возбудители, которые при определенных условиях (ослабление иммунитета, стресс, переохлаждение) могут вызвать заболевание
- Важен количественный анализ возбудителей
- Инкубационный период от 14-ти до 60-ти дней
- Клинические формы стертые или малосимптомные

Лобковый педикулез- паразитарное заболевание, передающееся преимущественно при половых контактах



- Пути заражения – половой и через постельное и нижнее белье
- Скрытый период практически отсутствует
- У маленьких детей, заразившихся от родителей, вши могут быть обнаружены в ресницах, бровях, области ушей и затылка

Генитальный герпес — попав в организм переносится в нервные ганглии, где может сохраняться всю жизнь



Заражение происходит половым путем и внеполовым через предметы обихода

Доказано заражение плода через плаценту, а также во время родов от инфицированной матери

Инкубационный период при первичном заражении — около 7-ми дней

Поражение плода ведет к задержке его развития, тяжелыми поражениями нервной системы, самопроизвольным выкидышам и преждевременным родам

Аногенитальные бородавки (остроконечные кондиломы) – возбудитель Вирус Папилломы Человека ВПЧ



- Описано более 60-ти видов папилломавирусов
- Остроконечные кондиломы вызывает папилломавирус 6 и 9 типов, который может привести к развитию рака шейки матки
- Пути передачи вируса – половой, через предметы личной гигиены, от инфицированной матери к ребенку в родах
- Однако, не каждый контакт с больным приводит к заражению
- Факторы риска – другие ИППП, иммунодефицитные состояния, нарушение целостности кожи и слизистых

Чесотка – заразное паразитарное заболевание кожи



- Источник заражения – больной человек
- Заражение при прямом контакте – половом, совместном пребывании в постели, при массаже, через предметы личного пользования (мочалка, полотенце)
- Типичен зуд, усиливающийся ночью, характерная локализация клинических проявлений
- Скрытый период – от нескольких часов до 6-ти дней
- Может осложняться гнойничковой инфекцией

Методы лабораторной диагностики ИППП



- Сифилис – серологические методы исследования крови
- Гонорея, трихомониаз – бактериологическая диагностика
- Хламидиоз – 2 и более методов исследования / ПЦР, РИФ, ИФА /
- Микоплазмоз и уреаплазмоз – определение наличия возбудителя и его количества
- ВПЧ, герпес – ДНК - диагностика

Что делать, если

(Мирамистин, интим-спрей, гексикон, хлоргексидин)



- Следует помочиться, вымыть руки и половые органы
- Обработать кожу лобка, внутреннюю поверхность бедер, половые органы
- Носик насадки ввести в отверстие мочеиспускательного канала и плотно прижимая к нему стенки канала ввести 2 – 3 мл содержимого флакона
- Не разжимая пальцы извлечь насадку, задержав раствор на 2 – 3 минуты внутри канала
- После этого желательно не мочиться 2 часа
- Кроме этого, женщинам необходимо провести спринцевание влагалища 150 -200 мл раствора

Вам поставили диагноз - ИППП



- Лечение проводится в кожно-венерологических учреждениях
- Обследование и санация полового партнера
- Лечение тем эффективнее, чем раньше оно начато
- Строгое соблюдение врачебных рекомендаций, правил личной гигиены
- Самолечение – опасно !!!!

Принципы лечения ИППП



- Антибиотики (2 и более)
- Иммуномодуляторы
- Местное лечение
- Физиолечение
- Воздержание от половой жизни на время лечения
- Запрет на употребление алкоголя

Как защитить себя от ИППП



- Не начинать половую жизнь до совершеннолетия
- Правильный выбор полового партнера
- Верность одному человеку
- Исключение случайных половых контактов
- Грамотное использование барьерной контрацепции - презерватива

Правила пользования презервативами



- Не использовать презервативы с истекшим сроком годности, а также б/у
- Проверить целостность презерватива перед одеванием
- Не хранить презервативы под воздействием прямых солнечных лучей
- Конец надетого презерватива должен оставаться свободным для изливающейся спермы

БЕРЕГИТЕ ЗДОРОВЬЕ И ЛЮБОВЬ

